

УДК 517.518

О конструкции и некоторых свойствах самоподобных функций в пространствах $L_p[0, 1]$

И. А. Шейпак

Аннотация. В статье приводится конструкция аффинно-самоподобных функций. В терминах параметров преобразований самоподобия дается условие принадлежности этих функций классам $L_p[0, 1]$, а также пространству $C[0, 1]$. Изучаются некоторые свойства этих функций (монотонность, ограниченность вариации). Устанавливается связь самоподобных функций с самоподобными мерами.

1. Введение

Самоподобные (фрактальные) объекты (множества, меры, функции) нашли широкое применение в различных областях математики. Одним из способов построения таких объектов является применение теоремы о неподвижной точке сжимающего отображения в полном метрическом пространстве. Достаточно общую конструкцию самоподобных множеств и мер, опирающуюся на такой подход, а также некоторые их приложения можно найти, например, в [1].

Одним из важных приложений самоподобных непрерывных функций является теория сжатия компьютерных изображений (см. [2]). При этом, в основном, решаются вопросы интерполяции изображаемых объектов или их границ непрерывными самоподобными функциями, значения которых заданы в конечном наборе точек. В конструкции этих функций параметры отображений, определяющих самоподобие, могут быть вычислены через узлы интерполяции.

Кроме того, самоподобные меры находят применение и в спектральной теории операторов ([3]) и в гармоническом анализе ([4], [5]). Заметим, что в работе [5] терминология «самоподобные меры» не употреблялась, но конструкция мер, коэффициенты Фурье-Стилтьеса которых не стремятся к нулю, тем не менее использует идею самоподобия. Различные задачи, связанные с изучением свойств вероятностных самоподобных мер, естественным образом возникают в теории фрактальных кривых, изучение которых началось с уже ставших классическими работы [6]–[8]. Впоследствии непрерывные фрактальные кривые нашли применение в теории функций, теории вероятностей, эргодической теории и т.д. [9]–[11].

Большое развитие теория фрактальных кривых получила после того, как обнаружилась её связь с теорией всплесков (вейвлетов) и масштабирующих функций (см., например, [12]). В частности, определённый интерес представляет исследование гладкости решений масштабирующих уравнений в различных функциональных пространствах. Например, в работе [13] были получены оценки сверху на показатель Гёльдера этих решений в пространстве $C[0, 1]$. В [14] были получены критерии таких свойств решений масштабирующих уравнений, как абсолютная непрерывность, сингулярная непрерывность, ограниченность вариации.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 04-01-00712 и поддержки ведущих научных школ № НШ-5247.2006.1

Расширением понятий самоподобных мер и непрерывных функций являются функции из пространств L_p . В связи с этим необходимо упомянуть о введённых в работе [15] суммируемых фрактальных кривых. В этой работе были получены критерии существования фрактальной кривой и принадлежности её классам L_p в терминах спектральных p -радиусов ρ_p [16]. Кроме того, там же были выведены формулы для показателей гладкости в различных функциональных пространствах.

Некоторые частные случаи квадратично-суммируемых самоподобных функций были рассмотрены в [17]. Свойства самих функций не изучались. Основное отличие конструкции самоподобных функций из $L_p[0, 1]$ от самоподобных непрерывных функций заключается в том, что параметры самоподобия нельзя определить через значения функции в некотором наборе точек.

Упомянутые работы ([3], [17]), а также некоторые результаты работы [18] указывают на тесную связь спектра некоторых граничных задач с такими свойствами самоподобных функций как монотонность, непрерывность, абсолютная непрерывность, ограниченность вариации. В связи с этим изучение указанных и других свойств самоподобных функций различных классов представляет интерес для многих математических направлений.

Целью данной работы является построение самоподобных функций в $L_p[0, 1]$ и исследование некоторых их свойств (непрерывность, монотонность, ограниченность вариации). В основе конструирования таких функций лежит теорема о неподвижной точке сжимающего отображения в полном метрическом пространстве. Предлагаемый подход, с одной стороны является более общим, по сравнению с построением фрактальных кривых (отрезки разбиения могут иметь различную длину). С другой стороны, фрактальная кривая принадлежит $\mathbb{R}^n$. В случае, когда самоподобная функция является непрерывной, эту конструкцию можно переформулировать в терминах узлов интерполяции (см. [2]). В случае, когда самоподобная функция является неубывающей, она естественным образом порождает самоподобную меру. Самоподобной функции ограниченной вариации соответствует самоподобный заряд.

2. Самоподобные функции в пространстве $L_p[0, 1]$

2.1. Операторы подобия в пространстве $L_p[0, 1]$. Пусть фиксировано натуральное число $n > 1$, и пусть вещественные числа $a_k > 0$, $c_k > 0$, d_k и β_k , где $k = 1, \dots, n$, таковы, что

$$\sum_{k=1}^n a_k = 1.$$

Данному набору чисел и произвольному $x \in [0, 1]$ можно поставить в соответствие непрерывный нелинейный оператор $G : L_p[0, 1] \rightarrow L_p[0, 1]$ вида

$$G(f) = \sum_{k=1}^n \{ \beta_k \cdot \chi_{(\alpha_k, \alpha_{k+1})} + c_k \cdot x + d_k \cdot G_k(f) \}, \quad (2.1)$$

где использованы следующие обозначения:

- (1) через α_k , где $k = 1, 2, \dots, n+1$, обозначены числа $\alpha_1 = 0$ и $\alpha_k = \sum_{l=1}^{k-1} a_l$, где $k = 2, \dots, n+1$;
- (2) через $\chi_{(\zeta, \xi)}$ обозначена характеристическая функция интервала (ζ, ξ) , рассматриваемая как элемент пространства $L_p[0, 1]$;

(3) через G_k , где $k = 1, \dots, n$, обозначены непрерывные линейные операторы в пространстве $L_p[0, 1]$, действующие на функцию f согласно правилу

$$G_k(f)(t) = f(a_k t + \alpha_k), \quad k = 1, \dots, n. \quad (2.2)$$

Операторы G вида (2.1) будут называться *операторами подобия*.

Этот оператор на непрерывные функции действует следующим образом:

$$G(f)(t) = c_k \cdot t + d_k \cdot f(t) + \beta_k, \quad (2.3)$$

где $x \in [\alpha_k, \alpha_{k+1}]$, $t \in [0, 1]$, а переменные x и t связаны соотношением $t = a_k \cdot x + \alpha_k$, $k = 1, 2, \dots, n$.

Это отображение является частью бóльшего отображения A , действующего на график непрерывной функции. Чтобы описать его, введем операторы A_k :

$$A_k \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_k & 0 \\ c_k & d_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \beta_k \end{pmatrix}.$$

Отображение A определено так

$$A \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix} = \bigcup_{k=1}^n A_k \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

Среди всех операторов подобия для дальнейшего изложения наибольший интерес представляют сжимающие операторы.

ЛЕММА 2.1. *Оператор подобия G является сжимающим в $L_p[0, 1]$ в том и только том случае, когда справедливы неравенства*

$$\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p < 1 \quad (1 \leq p < +\infty), \quad (2.4)$$

$$\max_{1 \leq k \leq n} |d_k| < 1 \quad (p = +\infty). \quad (2.5)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При $p < \infty$ утверждение доказываемой леммы следует из того факта, что при любых $f_1, f_2 \in L_p[0, 1]$ справедливы соотношения

$$\begin{aligned} \|G(f_1) - G(f_2)\|_{L_p[0,1]}^p &= \int_0^1 |G(f_1) - G(f_2)|^p dx = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(|d_k|^p \int_{\alpha_k}^{\alpha_{k+1}} |G_k(f_1) - G_k(f_2)|^p dx \right) = \left(\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p \right) \int_0^1 |f_1 - f_2|^p dx = \\ &= \left(\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p \right) \|f_1 - f_2\|_{L_p[0,1]}^p. \end{aligned}$$

При $p = +\infty$ справедливо неравенство

$$\|f_1 - f_2\|_{L_\infty[0,1]} \leq \max_k |d_k| \|f_1 - f_2\|_{L_\infty[0,1]}.$$

□

Из леммы 2.1 и принципа сжимающих отображений немедленно вытекает справедливость следующего утверждения.

ТЕОРЕМА 2.1. Если справедливо неравенство (2.4) ($1 \leq p < +\infty$), или (2.5) ($p = +\infty$), то существует и единственна функция $f \in L_p[0, 1]$, удовлетворяющая уравнению $G(f) = f$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Функции, заданные условием $G(f) = f$ при некотором сжимающем операторе подобия G будем называть *аффинно-самоподобными* или просто *самоподобными*. Числа $\{a_k\}$, $\{c_k\}$, $\{d_k\}$ и $\{\beta_k\}$, $k = 1, 2, \dots, n$ будем называть параметрами самоподобия.

В дальнейшем всегда будет предполагаться, что неравенство (2.4) или (2.5) выполнено.

ЗАМЕЧАНИЕ 2.1. Набор чисел $\{\alpha_k\}$, как нетрудно видеть, задает разбиение отрезка $[0, 1]$: $0 = \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < 1 = \alpha_{n+1}$. Числа a_k отвечают за горизонтальное сжатие функции f , а числа d_k за вертикальное сжатие.

ЗАМЕЧАНИЕ 2.2. Параметры c_k не влияют на свойство сжимаемости оператора G .

ЗАМЕЧАНИЕ 2.3. Для фрактальных кривых, заданных семейством аффинных (не обязательно сжимающих) операторов условию (2.4) при $p \in [1, +\infty)$ соответствует условие $\rho_p < 1$ (см., например, [15]), где ρ_p — p -радиус этих операторов.

Одной и той же функции могут соответствовать разные параметры самоподобия. Например, функция $f(x) = x$ на отрезке $[0, 1]$ может быть задана как набором $n = 2$, $a_1 = a_2 = 1/2$, $c_1 = c_2 = 1/2$, $d_1 = d_2 = 0$, $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 1/2$, так и набором $n = 3$, $a_1 = a_2 = a_3 = 1/3$, $c_1 = c_2 = c_3 = 1/3$, $d_1 = d_2 = d_3 = 0$, $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 1/3$, $\beta_3 = 1/3$.

2.2. Неравенства, оценивающие нормы самоподобных функций $f \in L_p[0, 1]$ через параметры самоподобия. На пространстве n -мерных векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ введем весовую норму для пары векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ и фиксированного $s \in [1, +\infty)$

$$\|\{x, y\}\|_{s,a} = \left(\sum_{k=1}^n (|x_k| + |y_k|)^s a_k \right)^{1/s},$$

где коэффициенты a_k удовлетворяют условиям $0 < a_k < 1$, $k = 1, 2, \dots, n$, $\sum_{k=1}^n a_k = 1$.

Кроме того, для облегчения выкладок введем обозначение

$$r_p = \sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p.$$

Легко заметить, что из условия $r_p < 1$ для любого $1 \leq s < p$ также вытекает условие $r_s < 1$ и, более того, $r_s \leq (r_p)^{\frac{s}{p}}$.

При $p = +\infty$ введенные выше величины не зависят от чисел $\{a_k\}$ и, соответственно, определяются так:

$$\|\{x, y\}\|_{\infty} = \max_{1 \leq k \leq n} \{|x_k| + |y_k|\}, \quad r_{\infty} = \max_{1 \leq k \leq n} \{|d_k|\}.$$

Справедлива следующая теорема.

ТЕОРЕМА 2.2. Для самоподобной функции $f \in L_p[0, 1]$ ($p \in \mathbb{N}$) с параметрами самоподобия a_k , c_k , d_k , β_k выполнено неравенство

$$\|f\|_{L_p[0,1]} \leq \frac{\sum_{s=1}^p \|\{c, \beta\}\|_{s,a}}{(\prod_{s=1}^p (1 - r_s))^{1/p}}, \quad (2.6)$$

где $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство проведем методом математической индукции по p .

Действительно, при $p = 1$ справедливы следующие выкладки

$$\begin{aligned} \|f\|_{L_1[0,1]} &= \int_0^1 |f(x)| dx = \sum_{k=1}^n \int_{\alpha_k}^{\alpha_{k+1}} |f(x)| dx = \\ &= \sum_{k=1}^n \int_0^1 |c_k \cdot t + \beta_k + d_k \cdot f(t)| a_k dt \leq \sum_{k=1}^n (|c_k| + |\beta_k|) a_k + \left(\sum_{k=1}^n a_k |d_k| \right) \|f\|_{L_1[0,1]}, \end{aligned}$$

из которых следует справедливость неравенства (2.6) при $p = 1$.

Допустим, что неравенство (2.6) верно при $j = 1, 2, \dots, p-1$. Если $f \in L_p[0, 1]$, то, очевидно, $f \in L_s[0, 1] \forall s \in [1, p)$. Тогда справедливы следующие преобразования

$$\begin{aligned} \|f\|_{L_p[0,1]}^p &= \sum_{k=1}^n \int_{\alpha_k}^{\alpha_{k+1}} |f(x)|^p dx = \sum_{k=1}^n \int_0^1 |c_k \cdot t + \beta_k + d_k \cdot f(t)|^p a_k dt \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=0}^{p-1} C_p^j (|c_k| + |\beta_k|)^{p-j} |d_k|^j a_k \|f\|_{L_j[0,1]}^j + \left(\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p \right) \|f\|_{L_p[0,1]}^p, \end{aligned}$$

из которых вытекает неравенство

$$(1 - r_p) \|f\|_{L_p[0,1]}^p \leq \sum_{k=1}^n (|c_k| + |d_k|)^p a_k + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{p-1} C_p^j (|c_k| + |d_k|)^{p-j} |d_k|^j a_k \|f\|_{L_j[0,1]}^j. \quad (2.7)$$

Учитывая предположение индукции при $j = 1, 2, \dots, p-1$:

$$\|f\|_{L_j[0,1]}^j \leq \frac{\left(\sum_{s=1}^j \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^j}{\prod_{s=1}^j (1 - r_s)} \leq \frac{(\sum_{s=1}^{p-1} \|\{c, \beta\}\|_{s,a})^j}{\prod_{s=1}^{p-1} (1 - r_s)},$$

а также применяя неравенство Гёльдера к сумме:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (|c_k| + |d_k|)^{p-j} |d_k|^j a_k &= \sum_{k=1}^n (|c_k| + |d_k|)^{p-j} a_k^{\frac{p-j}{p}} a_k^{\frac{j}{p}} |d_k|^j \leq \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^n (|c_k| + |d_k|)^p a_k \right)^{\frac{p-j}{p}} \left(\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p \right)^{\frac{j}{p}} = \|\{c, \beta\}\|_{p,a}^{p-j} r_p^{\frac{j}{p}} \leq \|\{c, \beta\}\|_{p,a}^{p-j}, \end{aligned}$$

неравенство (2.7) преобразуем к следующему виду:

$$(1 - r_p) \|f\|_{L_p[0,1]}^p \leq \|\{c, \beta\}\|_{p,a}^p + \sum_{j=1}^{p-1} C_p^j \|\{c, \beta\}\|_{p,a}^{p-j} \frac{(\sum_{s=1}^{p-1} \|\{c, \beta\}\|_{s,a})^j}{\prod_{s=1}^{p-1} (1 - r_s)}.$$

Из последнего неравенства тем более следует неравенство

$$(1 - r_p) \|f\|_{L_p[0,1]}^p \leq \frac{(\sum_{s=1}^p \|\{c, \beta\}\|_{s,a})^p}{\prod_{s=1}^{p-1} (1 - r_s)},$$

что и завершает доказательство теоремы. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 2.4. В пространстве $L_\infty[0, 1]$ неравенство для нормы f , аналогичное (2.6) имеет вид:

$$\|f\|_{L_\infty[0,1]} \leq \frac{\max_k \{|c_k| + |\beta_k|\}}{1 - \max_k |d_k|} = \frac{\|\{c, \beta\}\|_\infty}{1 - r_\infty}.$$

Докажем аналогичные оценки для дробного p . Для этого нецелое число $p > 1$ представим в виде $p = [p] + \{p\}$, где $[p]$ — обозначает целую часть числа p , а $\{p\}$ — дробную часть числа p , $\{p\} \neq 0$.

ТЕОРЕМА 2.3. Для самоподобной функции $f \in L_p[0, 1]$, $\{p\} \neq 0$ справедлива оценка

$$\|f\|_{L_p[0,1]} \leq C \cdot \frac{\left(\|\{c, \beta\}\|_{[p],a}^{[p]} + \sum_{s=1}^{[p]} \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^{\frac{[p]}{p}}}{\left((1 - r_p) \prod_{s=1}^{[p]} (1 - r_s) \right)^{\frac{1}{p}}}.$$

где

$$C = \left(\max \left\{ \max_k \{(|c_k| + |\beta_k|)^{\{p\}}\}, \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\}, \left(\sum_{s=1}^{[p]} \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^{\{p\}} \right\} \right)^{\frac{1}{p}}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Справедлива следующая цепочка неравенств

$$\begin{aligned} \|f\|_{L_p[0,1]} &\leq \sum_{k=1}^n \int_0^1 |c_k \cdot t + \beta_k + d_k \cdot f(t)|^{[p]} (|c_k| \cdot t + |\beta_k| + |d_k| \cdot |f(t)|)^{\{p\}} a_k dt \leq \\ &\leq \max_k \{(|c_k| + |\beta_k|)^{\{p\}}\} \sum_{k=1}^n \int_0^1 |c_k \cdot t + \beta_k + d_k \cdot f(t)|^{[p]} a_k dt + \\ &+ \sum_{k=1}^n \int_0^1 |c_k \cdot t + \beta_k + d_k \cdot f(t)|^{[p]} |d_k|^{\{p\}} |f(t)|^{\{p\}} a_k dt \leq \\ &\leq \max_k \{(|c_k| + |\beta_k|)^{\{p\}}\} \|f\|_{L_{[p]}[0,1]}^{[p]} + \sum_{k=1}^n \int_0^1 (|c_k| + |\beta_k| + |d_k| \cdot |f(t)|)^{[p]} |d_k|^{\{p\}} |f(t)|^{\{p\}} a_k dt. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Преобразуем последнюю сумму в последнем неравенстве.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \int_0^1 (|c_k| + |\beta_k| + |d_k| \cdot |f(t)|)^{[p]} |d_k|^{\{p\}} |f(t)|^{\{p\}} a_k dt = \\ = \sum_{k=1}^n \int_0^1 \left(\sum_{j=0}^{[p]} C_{[p]}^j (|c_k| + |\beta_k|)^{[p]-j} |d_k|^j |f(t)|^j \right) |d_k|^{\{p\}} |f(t)|^{\{p\}} a_k dt. \end{aligned}$$

В последнем выражении слагаемое при $j = [p]$ имеет вид

$$\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p \int_0^1 |f(t)|^p dt = r_p \|f\|_{L_p[0,1]}^p. \quad (2.9)$$

Поменяв порядок суммирования, оставшиеся слагаемые можно переписать в виде

$$\sum_{j=0}^{[p]-1} C_{[p]}^j \sum_{k=1}^n (|c_k| + |\beta_k|)^{[p]-j} |d_k|^j |d_k|^{\{p\}} a_k \int_0^1 |f(t)|^{j+\{p\}} dt. \quad (2.10)$$

Суммы по k в выражении (2.10) допускает оценку

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (|c_k| + |\beta_k|)^{[p]-j} |d_k|^j |d_k|^{\{p\}} a_k &\leq \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\} \left(\sum_{k=1}^n (|c_k| + |\beta_k|)^{[p]} a_k \right)^{\frac{[p]-j}{[p]}} \left(\sum_{k=1}^n a_k |d_k|^{[p]} \right)^{\frac{j}{[p]}} = \\ &= \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\} \|\{c, \beta\}\|_{[p],a}^{[p]-j} r_{[p]}^{\frac{j}{[p]}} \leq \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\} \|\{c, \beta\}\|_{[p],a}^{[p]-j}, \quad j = 0, 1, \dots, [p] - 1. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Здесь мы применили неравенство Гёльдера с показателями $p_1 = \frac{[p]}{[p]-j}$ и $q_1 = \frac{[p]}{j}$.

Интегралы допускают следующую оценку

$$\int_0^1 |f(t)|^{j+\{p\}} dt \leq \left(\int_0^1 |f(t)|^{j+1} dt \right)^{\frac{j+\{p\}}{j+1}} = \|f\|_{L_{j+1}[0,1]}^{j+\{p\}} \leq \|f\|_{L_{[p]}[0,1]}^{j+\{p\}}, \quad j = 0, 1, \dots, [p] - 1. \quad (2.12)$$

Здесь также применено неравенство Гёльдера с показателями $p_1 = \frac{j+1}{j+\{p\}}$ и $q_1 = \frac{j+1}{1-\{p\}}$.

Подставив теперь соотношение (2.9) и неравенства (2.11)–(2.12) в неравенство (2.8), получим

$$(1 - r_p) \|f\|_{L_p[0,1]}^p \leq \max_k \{(|c_k| + |\beta_k|)^{\{p\}}\} \|f\|_{[p]}^{[p]} + \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\} \sum_{j=0}^{[p]-1} C_{[p]}^j \|\{c, \beta\}\|_{[p],a}^{[p]-j} \|f\|_{L_{[p]}[0,1]}^{j+\{p\}}.$$

С учетом соотношения (2.6) получаем, что

$$\begin{aligned} (1 - r_p) \|f\|_{L_p[0,1]}^p &\leq \max_k \{(|c_k| + |\beta_k|)^{\{p\}}\} \frac{\left(\sum_{s=1}^{[p]} \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^{[p]}}{\prod_{s=1}^{[p]} (1 - r_s)} + \\ &+ \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\} \sum_{j=0}^{[p]-1} C_{[p]}^j \|\{c, \beta\}\|_{[p],a}^{[p]-j} \frac{\left(\sum_{s=1}^{[p]} \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^{j+\{p\}}}{\left(\prod_{s=1}^{[p]} (1 - r_s) \right)^{\frac{j+\{p\}}{[p]}}}, \end{aligned}$$

что окончательно можно оценить таким образом:

$$\begin{aligned} (1 - r_p) \|f\|_{L_p[0,1]}^p &\leq \max \left\{ \max_k \{(|c_k| + |\beta_k|)^{\{p\}}\}, \max_k \{|d_k|^{\{p\}}\}, \left(\sum_{s=1}^{[p]} \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^{\{p\}} \right\} \times \\ &\times \frac{\left(\|\{c, \beta\}\|_{[p],a}^{[p]} + \sum_{s=1}^{[p]} \|\{c, \beta\}\|_{s,a} \right)^{[p]}}{\prod_{s=1}^{[p]} (1 - r_s)}. \end{aligned}$$

□

СЛЕДСТВИЕ 2.1. Для фиксированного $p \in [1, +\infty]$ и любых $R > 0$, $\varepsilon > 0$ рассмотрим всевозможные сжимающие отображения в $L_p[0, 1]$, заданные параметрами $\{a_k\}$, $\{c_k\}$, $\{d_k\}$, $\{\beta_k\}$, $k = 1, 2, \dots, n$, такими что

$$\begin{aligned} \|\{c, \beta\}\|_{p,a} &\leq R, & \sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p &\leq 1 - \varepsilon, & 1 \leq p < \infty \\ \|\{c, \beta\}\|_{\infty} &\leq R, & \max_{1 \leq k \leq n} |d_k| &\leq 1 - \varepsilon, & p = \infty. \end{aligned}$$

Тогда все функции, являющиеся неподвижными точками таких сжимающих отображений, образуют ограниченное множество в $L_p[0, 1]$.

2.3. Непрерывная зависимость неподвижной точки сжимающего отображения от параметров d_k , c_k , β_k , $k = 1, 2, \dots, n$. Пусть задано разбиение отрезка $[0, 1]$: $0 = \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < 1$. Числа a_k являются длинами отрезков разбиения:

$$a_k = \alpha_k - \alpha_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Зададим также два набора чисел d_k , c_k , β_k и d'_k , c'_k , β'_k , $k = 1, 2, \dots, n$, удовлетворяющие условиям

$$r_p = \sum_{k=1}^n a_k |d_k|^p < 1, \quad r'_p = \sum_{k=1}^n a_k |d'_k|^p < 1$$

при некотором фиксированном $p \in [1, +\infty)$. Эти наборы порождают два сжимающих отображения G и G' , неподвижными точками которых соответственно будут функции f и g .

При $p = +\infty$ предполагается, что параметры самоподобия удовлетворяют условиям

$$r_{\infty} = \max_{1 \leq k \leq n} \{|d_k|\} < 1, \quad r'_{\infty} = \max_{1 \leq k \leq n} \{|d'_k|\} < 1$$

Утверждение теорем 2.2 и 2.3 означает, что операторы подобия G непрерывно зависят от параметров d_k , c_k , β_k , $k = 1, 2, \dots, n$. Применяя известный результат о непрерывной зависимости неподвижной точки сжимающего оператора от параметра (см., например, [2], лемма 2, стр. 111), получаем следующее утверждение.

ТЕОРЕМА 2.4. Самоподобная функция, являющаяся неподвижной точкой сжимающего отображения, непрерывно зависит от параметров самоподобия, а именно, если $c_k \rightarrow c'_k$, $d_k \rightarrow d'_k$ и $\beta_k \rightarrow \beta'_k$, $k = 1, 2, \dots, n$, то $\|f - g\|_{L_p[0,1]} \rightarrow 0$.

В частности, при $p \in [1, +\infty)$ несложно получить следующие оценки:

$$\|f - g\|_{L_p[0,1]} \leq \frac{2^p \|\{c - c', \beta - \beta'\}\|_{p,a} + 2^{p-1} (\sum_{k=1}^n a_k |d_k - d'_k|^p)^{\frac{1}{p}} (\|g\|_{L_p[0,1]} + \|f\|_{L_p[0,1]})}{2 - r_p^{\frac{1}{p}} - r'^{\frac{1}{p}}_p}.$$

В $L_{\infty}[0, 1]$ аналогичные оценки выглядят так:

$$\|f - g\|_{L_{\infty}[0,1]} \leq \frac{2 \|\{c - c', \beta - \beta'\}\|_{\infty} + \max_k \{|d_k - d'_k|\} (\|f\|_{L_{\infty}[0,1]} + \|g\|_{L_{\infty}[0,1]})}{2 - r_{\infty} - r'_{\infty}}.$$

3. Непрерывные самоподобные функции

Укажем условия на числа $\{c_k\}_{k=1}^n$, $\{d_k\}_{k=1}^n$ и $\{\beta_k\}_{k=1}^n$, при которых оператор подобия G задает непрерывную функцию.

ТЕОРЕМА 3.1. *Сжимающий оператор подобия G задает непрерывную функцию тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:*

$$\max_{1 \leq k \leq n} |d_k| < 1, \quad (3.1)$$

$$\beta_1 = f(0)(1 - d_1), \quad (3.2)$$

$$\beta_k = \sum_{j=1}^{k-1} c_j + f(1) \sum_{j=1}^{k-1} d_j + f(0)(1 - \sum_{j=1}^k d_k), \quad k = 2, 3, \dots, n, \quad (3.3)$$

$$\sum_{j=1}^n c_j + (f(1) - f(0)) \sum_{j=1}^n d_j = f(1) - f(0). \quad (3.4)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Оператор подобия G будет сжимающим в пространстве $C[0, 1]$ при выполнении условия

$$|d_k| < 1, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

что может быть получено аналогично рассуждениям в лемме 2.1 для пространства $L_\infty[0, 1]$.

Пусть дано разбиение $\{\alpha_k\}_{k=1}^n$. Если функция f является неподвижной точкой отображения G , то $f(\alpha_k) = G_{k+1}(f(0)) = G_k(f(1))$, $k = 2, 3, \dots, n-1$. Кроме того, $G_1(f(0)) = f(0)$ и $G_n(f(1)) = f(1)$. Отсюда следует, что самоподобная непрерывная функция f удовлетворяет в точках α_k условиям

$$d_1 f(0) + \beta_1 = f(0) \quad \text{в точке } 0 = \alpha_1, \quad (3.5)$$

$$c_k + d_k f(1) + \beta_k = d_{k+1} f(0) + \beta_{k+1} = f(\alpha_k) \quad \text{в точках } \alpha_k \quad k = 2, 3, \dots, n-1, \quad (3.6)$$

$$c_n + d_n f(1) + \beta_n = f(1) \quad \text{в точке } \alpha_{n-1}. \quad (3.7)$$

Эти соотношения равносильны следующим равенствам

$$\beta_1 = f(0)(1 - d_1),$$

$$\beta_k = \sum_{j=1}^{k-1} c_j + f(1) \sum_{j=1}^{k-1} d_j + f(0)(1 - \sum_{j=1}^k d_k), \quad k = 2, 3, \dots, n,$$

$$\sum_{j=1}^n c_j + (f(1) - f(0)) \sum_{j=1}^n d_j = f(1) - f(0).$$

Условия (3.1) и (3.2)–(3.4) являются необходимыми и достаточными условиями, чтобы функция $G(f)$ была непрерывна в точках α_k , если исходная функция f непрерывна. В интервалах (α_{k-1}, α_k) непрерывная функция f под действием сжимающего отображения отображения G перейдет в непрерывную функцию $G(f)$. В результате при выполнении условий (3.1)–(3.2) произвольная непрерывная на отрезке $[0, 1]$ функция f перейдет в непрерывную функцию $G(f)$. Таким образом, для произвольной непрерывной начальной функции f_0 последовательность непрерывных функций $f_n = G^{n-1} f_0$ равномерно сходится к неподвижной функции сжимающего отображения и этот предел является непрерывной функцией. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 3.1. Условия (3.2)–(3.4) являются обобщением условия Барнсли (или перекрёстного условия) [2].

Условие (3.1) было получено в [2]. Условия (3.2)–(3.4) не описывались, потому что в этой работе решалась задача интерполяции. А именно, описать все непрерывные аффино-самоподобные функции, графики которых проходят через заданные точки (x_k, y_k) $k = 1, 2, \dots, n$. Коэффициенты $\{d_k\}$ задаются произвольно, но подчиненные условию (3.1). Остальные параметры операторов подобия $\{a_k\}$, $\{c_k\}$, $\{\alpha_k\}$ и $\{\beta_k\}$, $k = 1, 2, \dots, n$ выражаются через координаты узлов интерполяции и коэффициенты $\{d_k\}$. В нашем случае самоподобная функция f проходит через точки (α_k, β_k) . Через параметры самоподобия не выражаются значения $f(0)$ и $f(1)$.

При описании самоподобных вероятностных мер бывает более удобным рассматривать функции, заданные на отрезке $[0, 1]$ и принимающие на концах значения $f(0) = 0$ и $f(1) = 1$. В этом случае условия (3.2)–(3.4) принимают более простой вид:

$$\begin{aligned}\beta_1 &= 0, \\ \beta_k &= \sum_{j=1}^{k-1} (c_j + d_j), \quad k = 2, 3, \dots, n, \\ \sum_{j=1}^n (c_j + d_j) &= 1.\end{aligned}$$

4. Связь самоподобных функций из $L_p[0, 1]$ и самоподобных мер

Напомним вкратце конструкцию самоподобных мер. Общую конструкцию фрактальных и самоподобных мер можно найти, например, в [1]. Некоторые частные случаи самоподобных сингулярных мер представлены в работе [3]. Ограничимся рассмотрением вероятностных мер.

Пусть S_k , $k = 1, 2, \dots, n$ — семейство сжимающих отображений единичного отрезка $I_0 = [0, 1]$ в себя, удовлетворяющие условию $S_k([0, 1]) = [\alpha_k, \alpha_{k+1}]$. Пусть также дан набор положительных чисел $\{\rho_k\}_{k=1}^n$, подчиняющихся условию $\sum_{k=1}^n \rho_k = 1$.

Тогда ([1]), существует и единственная мера μ , заданная уравнением самоподобия

$$\mu = \sum_{k=1}^n \rho_k \mu \circ S_k^{-1}.$$

Такие меры называют самоподобными.

С неубывающей непрерывной слева самоподобной функцией f свяжем меру:

$$\mu_f([\zeta, \xi)) = f(\xi) - f(\zeta).$$

Естественно возникает вопрос, является ли эта мера самоподобной.

В данной связи интерес представляет вопрос о нахождении условий в терминах параметров самоподобия $\{a_k\}$, $\{c_k\}$, $\{d_k\}$, $\{\beta_k\}$, гарантирующих неубывание самоподобной функции.

Рассмотрим ограниченные самоподобные функции, нормированные условиями $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. В этом случае $\beta_1 = 0$. Также удобно положить $\beta_{n+1} = 1$.

ТЕОРЕМА 4.1. *Чтобы самоподобная непрерывная слева ограниченная функция f была неубывающей необходимо, чтобы для всех $k = 1, 2, \dots, n$ выполнялось $c_k + d_k \geq 0$, $\beta_k \leq \beta_{k+1}$ и достаточно, чтобы для всех $k = 1, 2, \dots, n$ выполнялось $c_k \geq 0$, $d_k \geq 0$, $\beta_k \leq \beta_{k+1}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, из самоподобия функции f следует

$$\begin{aligned} f(\alpha_k + 0) &= G_k(f(0)) = c_k \cdot f(0) + \beta_k + d_k \cdot f(0) = \beta_k, \\ f(\alpha_{k+1} + 0) &= G_{k+1}(f(0)) = c_{k+1} \cdot f(0) + \beta_{k+1} + d_k \cdot f(0) = \beta_{k+1}. \end{aligned}$$

Из этих условий вытекает необходимость условий $\beta_k \leq \beta_{k+1}$. С другой стороны справедливы соотношения

$$f(\alpha_k) = G_{k-1}(f(1)) = c_{k-1} \cdot f(1) + \beta_{k-1} + d_{k-1} \cdot f(1) = c_{k-1} + \beta_{k-1} + d_{k-1} \leq \beta_k,$$

которые приводят к необходимости условий $c_k + d_k \geq 0$, $k = 1, 2, \dots, n$.

Для получения достаточных условий заметим, что при $\beta_{k-1} \leq \beta_k$ выполнено $f(\alpha_{k-1}) \leq f(a_k)$, т.е. функция неубывает «глобально» (в точках разбиения $\{\alpha_k\}$). Установим теперь неубывание функции на интервале (α_k, α_{k+1}) . Очевидно, что функция, являющаяся неподвижной точкой сжимающего отображения, неотрицательна при $c_k \geq 0$, $d_k \geq 0$, $\beta_{k-1} \leq \beta_k$. А для произвольной точки $x \in (\alpha_k, \alpha_{k+1})$ выполнено

$$f(x) = c_k \cdot t + d_k \cdot f(t) + \beta_k \geq f(\alpha_k + 0),$$

где $x = a_k \cdot t + \alpha_k$. □

Приведем пример, показывающий, что условия $\beta_{k-1} \leq \beta_k$, $c_k + d_k \geq 0$ не являются достаточными. Рассмотрим функцию с параметрами самоподобия $n = 3$, $a_1 = a_2 = a_3 = 1/3$, $c_1 = 0$, $d_1 = 1/2$, $\alpha_1 = \beta_1 = 0$, $c_2 = d > 0$, $d_2 = -d < 0$, $\beta_2 = 1/2$, $c_3 = 0$, $d_3 = 1/2$, $\beta_3 = 1/2$, где $0 < d < 1$ — произвольный параметр. Эта функция является непрерывной и легко видеть, что все необходимые условия выполнены. Тогда $f(1/3) = 1/2$, а $f(1/3 + 1/9) = d \cdot (1/3) - d \cdot f(1/3) + 1/2 = 1/2 - d/6 < 1/2$.

Рассмотрим неубывающие ограниченные самоподобные функции f , нормированные условиями $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Кроме того, пусть $c_k = 0$, $k = 1, 2, \dots, n$. В этом случае из теоремы 4.1 следует, что необходимыми и достаточными условиями неубывания функции будут условия $d_k \geq 0$, $\beta_k \leq \beta_{k+1}$, $k = 1, 2, \dots, n$. Легко заметить, что мера, построенная по такой самоподобной функции является самоподобной. При этом роль чисел ρ_k выполняют положительные числа d_k , а отображения $S_k^{-1}: [\alpha_k, \alpha_{k+1}] \rightarrow [0, 1]$ в данном случае действуют по правилу

$$S_k^{-1}(x) = \frac{x - \alpha_k}{a_k}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.1. Рассмотрение неубывающих самоподобных функций с ненулевыми параметрами $\{c_k\}$ приводит к самоподобным мерам с абсолютно-непрерывной частью. Подробное рассмотрение таких мер выходит за рамки данной статьи и является темой дальнейшего исследования.

4.1. Непрерывные самоподобные функции с неограниченной вариацией.

Рассмотрим непрерывные самоподобные функции, заданные некоторым набором самоподобия $\{a_k\}$, $\{c_k\}$, $\{d_k\}$, $\{\beta_k\}$ и нормированные условием $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Изучим только частный случай таких функций, а именно, предположим, что $c_k = 0$ $k = 1, 2, \dots, n$. В этом случае из условий (3.1)–(3.4) следует, что

$$\beta_1 = 0, \quad \beta_{k+1} - \beta_k = d_k, \quad \sum_{k=1}^n d_k = 1, \quad \max_{1 \leq k \leq n} \{|d_k|\} < 1.$$

Введем величину $D = \sum_{k=1}^n |d_k|$. Нетрудно видеть, что из условия $\sum_{k=1}^n d_k = 1$ следует, что $D \geq 1$.

ТЕОРЕМА 4.2. *Самоподобная непрерывная функция f , с параметрами самоподобия $\{a_k\}$, $\{c_k\}$, $\{d_k\}$, $\{\beta_k\}$, удовлетворяющая условиям $f(0) = 1$, $f(1) = 1$, $c_k = 0$ $k = 1, 2, \dots, n$, имеет ограниченную вариацию тогда и только тогда, когда $D \leq 1$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. *Шаг 1.* Построим последовательность T_m разбиений отрезка $[0, 1]$. Пусть $T_1 = \{\alpha_k\}_{k=1}^{n+1}$ ($\alpha_0 = 0, \alpha_{n+1} = 1$) — исходное разбиение отрезка. $T_m = \{a_k \cdot x + \alpha_k, x \in T_{m-1}, k = 1, 2, \dots, n\}$. Точки разбиения T_m делят отрезок $[0, 1]$ на n^m подотрезков.

Каждому отрезку, образованному разбиением T_m , сопоставим последовательность чисел $k_1, k_2, \dots, k_m$, $k_i = 1, 2, \dots, n$, $i = 1, 2, \dots, m$ (номер отрезка). Отрезку разбиения T_1 соответствует номер k_1 , если границы этого отрезка строятся по правилу

$$x_{k_1} = \alpha_{k_1}, \quad x_{k_1+1} = \alpha_{k_1+1}, \quad k_1 = 1, 2, \dots, n.$$

Отрезку разбиения T_2 соответствует пара k_1, k_2 , если его концы x_{k_2} и x_{k_2+1} построены по правилу

$$x_{k_2} = a_{k_2}x_{k_1} + \alpha_{k_2}, \quad x_{k_2+1} = a_{k_2}x_{k_1+1} + \alpha_{k_2}, \quad k_1, k_2 = 1, 2, \dots, n,$$

где $[x_{k_1}, x_{k_1+1}]$ — отрезок разбиения T_1 с номером k_1 . Далее построение последовательности номеров отрезка проводится по индукции: если каждому отрезку разбиения T_{m-1} соответствует последовательность $k_1, k_2, \dots, k_{m-1}$, то отрезок разбиения T_m имеет номер $k_1, k_2, \dots, k_m$, если его концы x_{k_m} и x_{k_m+1} построены по правилу

$$x_{k_m} = a_{k_m}x_{k_{m-1}} + \alpha_{k_m}, \quad x_{k_m+1} = a_{k_m}x_{k_{m-1}+1} + \alpha_{k_m},$$

где $[x_{k_{m-1}}, x_{k_{m-1}+1}]$ — отрезок с номером $k_1, k_2, \dots, k_{m-1}$, $k_i = 1, 2, \dots, n$, $i = 1, 2, \dots, m-1$. Нетрудно заметить, что длина отрезка с номером $k_1, k_2, \dots, k_m$ равна $a_{k_1}a_{k_2} \dots a_{k_m}$.

Шаг 2. Пусть $f_0(x) = x$ на $[0, 1]$. Последовательность $f_m = G(f_{m-1})$ сходится к предельной самоподобной функции. Докажем, что на отрезке с номером $k_1, k_2, \dots, k_m$ функция f_m линейна и

$$f_m(x) = \frac{d_{k_1}d_{k_2} \dots d_{k_m}}{a_{k_1}a_{k_2} \dots a_{k_m}}(x - x_{k_m}) + \sum_{j=1}^m \beta_{k_j} \prod_{i=j+1}^m d_{k_i}. \quad (4.1)$$

Очевидно, что по определению действия оператора подобия G на непрерывные функции (2.3), кусочно-линейная функция перейдет в кусочно-линейную же функцию. Пусть $[x_{k_1}, x_{k_1+1}]$ — отрезок разбиения T_1 с номером k_1 . В силу того же свойства (2.3) имеем

$$\begin{aligned} f_1(x_{k_1}) &= d_{k_1}f_0(0) + \beta_{k_1} = \beta_{k_1}, \\ f_1(x_{k_1+1}) &= d_{k_1}f_0(1) + \beta_{k_1} = \beta_{k_1+1}. \end{aligned}$$

Таким образом, на отрезке разбиения T_1 с номером k_1 функция f_1 линейна и на его концах принимает значения β_{k_1} и β_{k_1+1} , т. е. определяется формулой

$$f_1(x) = \frac{d_{k_1}}{a_{k_1}}(x - x_{k_1}) + \beta_{k_1}.$$

Дальнейшее рассуждение проведем по индукции. Пусть на отрезке разбиения T_m с номером $k_1, k_2, \dots, k_m$ функция f_m имеет вид (4.1). Концы отрезка разбиения T_{m+1} с номером $k_1, k_2, \dots, k_m, k_{m+1}$ строятся по правилу

$$x_{k_{m+1}} = a_{k_{m+1}}x_{k_m} + \alpha_{k_{m+1}}, \quad x_{k_{m+1}+1} = a_{k_{m+1}}x_{k_m+1} + \alpha_{k_{m+1}},$$

где $[x_{k_m}, x_{k_m+1}]$ — отрезок с номером $k_1, k_2, \dots, k_m$. На этом отрезке f_{m+1} кусочно-линейна и на его концах принимает значения

$$f_{m+1}(x_{k_m+1}) = d_{k_m+1}f_m(x_{k_m}) + \beta_{k_m+1} = \sum_{j=1}^m \beta_{k_j} \prod_{i=j+1}^m d_{k_i} + \beta_{k_m+1}$$

$$f_{m+1}(x_{k_{m+1}+1}) = d_{k_{m+1}}f_m(x_{k_m+1}) + \beta_{k_{m+1}} = d_{k_1}d_{k_2}\dots d_{k_m}d_{k_{m+1}} + \sum_{j=1}^m \beta_{k_j} \prod_{i=j+1}^m d_{k_i} + \beta_{k_{m+1}},$$

откуда и следует справедливость утверждения.

Шаг 3. Заметим, что в точках x_{k_1} разбиения T_1 выполнено

$$f_1(x_{k_1}) = d_{k_1}f_0(0) + \beta_{k_1} = \beta_{k_1}, \quad f(x_{k_1}) = d_{k_1}f(0) + \beta_{k_1}, \quad (4.2)$$

т. е.

$$f_1|_{T_1} = f|_{T_1}.$$

А для точек x_{k_m} разбиения T_m выполнено

$$f_m(x_{k_m}) = d_{k_m}f_{m-1}(x_{k_{m-1}}) + \beta_{k_m}, \quad f(x_{k_m}) = d_{k_m}f(x_{k_{m-1}}) + \beta_{k_m},$$

где x_{k_m} и $x_{k_{m-1}}$ — левые концы отрезков с номерами $k_1, k_2, \dots, k_m$ и $k_1, k_2, \dots, k_{m-1}$ соответственно. Из этих равенств с учетом (4.2) следует, что в точках разбиения T_m выполнены равенства

$$f_m|_{T_m} = f|_{T_m}.$$

Следовательно, вариации функций f и f_m по разбиению T_m совпадают.

Вариация функции f_m по разбиению T_m равна

$$\text{Var}_{T_m} f_m = \sum_{1 \leq k_1, k_2, \dots, k_m \leq n} |d_{k_1}d_{k_2}\dots d_{k_m}| = D^m,$$

Так как (см. [19], теорема 2, стр. 211) $\text{Var}_{T_m} f \rightarrow \text{Var}_0^1 f$ при $m \rightarrow \infty$, то $\text{Var}_{T_m} f_m \rightarrow \text{Var}_0^1 f$, где $\text{Var}_{T_m} f$ это вариация функции f по разбиению T_m .

Следовательно,

$$\text{Var}_0^1 f = \lim_{m \rightarrow \infty} D^m.$$

□

Таким образом, в классе непрерывных самоподобных функций, удовлетворяющих условиям $f(0) = 0$ и $f(1) = 1$, а параметры самоподобия которой подчинены условиям $c_k = 0$, $k = 1, 2, \dots, n$, ограниченную вариацию имеют только те функции, для которых $D = \sum_{k=1}^n |d_k| = 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. Для фрактальных кривых, заданных аффинными (не обязательно сжимающими) операторами, условию $D \leq 1$ соответствует условие $\rho_1 \leq 1$ [14].

5. Примеры

5.1. Некоторые конкретные самоподобные функции. 1) Характеристическая функция интервала $(\zeta, \xi) \subset [0, 1]$ является самоподобной функцией с параметрами самоподобия $n = 3$, $a_1 = \zeta$, $a_2 = \xi - \zeta$, $a_3 = 1 - \xi$, $c_1 = c_2 = c_3 = d_1 = d_2 = d_3 = \beta_1 = \beta_3 = 0$, $\beta_2 = 1$.

2) Кусочно-постоянная функция $f(x) = \sum_{k=1}^n s_k \chi_{[\alpha_k, \alpha_{k+1})}(x)$, где $0 = \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < \alpha_{n+1} = 1$ — разбиение отрезка $[0, 1]$, также является самоподобной функцией с параметрами самоподобия $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$, $d_1 = d_2 = \dots = d_n = 0$, $a_k = \alpha_{k+1} - \alpha_k$, $\beta_k = s_k$, $k = 1, 2, \dots, n$.

3) Рассмотрим двухпараметрическое семейство непрерывных функций $f_{a,\delta}$, где $a \in (0, 1/2)$ и $\delta \in [0, 1/3)$, определяемое параметрами самоподобия

$$n = 3, \quad a_1 = a_2 = a, \quad a_3 = 1 - 2a,$$

$$d_1 = d_3 = 1/2 + \delta, \quad d_2 = -2\delta, \quad \beta_1 = 0, \quad \beta_2 = d_1 = 1/2 + \delta, \quad \beta_3 = d_1 + d_2 = 1 - \delta.$$

В частности, $f_{1/3,0}$ представляет собой хорошо известную функцию Кантора. Для этих функций $D = \sum_{k=1}^3 |d_k| = 1 + 4\delta$ и при $\delta > 0$ выполнено $D > 1$, т.е. функции имеют неограниченные вариации.

Автор выражает благодарность В. Ю. Протасову за ряд ценных замечаний и полезные советы.

Список литературы

- [1] J. Hutchinson, *Fractals and Self-similarity*//Indiana University Math. J., **30** (1981), pp. 713–741.
- [2] M. Barnsley, *Fractals everywhere*//Academic Press, 1988.
- [3] M. Solomyak, E. Verbitsky, *On a spectral problem related to self-similar measures*//Bull. London Math. Soc., **27** (1995), pp. 242–248.
- [4] R.S.Strihartz, *Self-similar measures and their Fourier transform, I*// Indiana University Math.J.,**39** (1990) pp.797–817.
- [5] А.Зигмунд, *Тригонометрические ряды, том 1*, М., Мир,1965.
- [6] De Rham G., *Une peu de mathématique à propos d'une courbe plane*// Rev. de math. elemetaires, **2**:4,5 (1947), pp.73–76, 89–97.
- [7] De Rham G., *Sur une courbe plane*// J. Math. Pures Appl. (9), **35** (1956), pp. 25–42.
- [8] De Rham G., *Sur les courbes limitées de polygones obtenus par trisection*//Enseign. Math., (2), **5** (1959), pp.29–43.
- [9] Cavaretta A.S., Dahmen W., Micchelli C.A., *Stationary subdivision*//Mem. Amer. Math. Soc., **93**:453 (1991), p.186.
- [10] Г. А. Дерфель *Вероятностные методы для одного класса функционально-разностных уравнений*//Укр. матем. журн., **41**:10 (1989), стр. 1137–1141.
- [11] П. П. Никитин, *Хаусдорфова размерность гармонической меры на кривой де Рама*//Зап. науч. семинара ПОМИ, **283** (2001), стр. 206–223.
- [12] Daubechies I.,Lagarias J., *Two scale difference equations. I. Existence and global regularity of solutions*//SIAM. J. Anal., **22**:5 (1991), pp. 1388–1410.
- [13] Daubechies I.,Lagarias J., *Two scale difference equations. I. Local regularity, infinite products of matrices and fractals*//SIAM. J. Anal., **23**:4 (1992), pp. 1031–1079.
- [14] Protasov V. *Refinement equations with nonnegative coefficients*//J. Fourier Anal. Appl., **6**:1, (2000), pp. 55–78.
- [15] В. Ю. Протасов *Фрактальные кривые и всплески*//Изв.РАН. Серия матем., **70**:5 (2006), стр.105–145.
- [16] Lau K.-S., Wang J., *Characterization of L_p -solutions for two-scale dilation equations*//SIAM. J. Math. Anal., **26**:4, (1995), 1018–1046.
- [17] А. А. Владимиров, И. А. Шейпак, *Самоподобные функции в пространстве $L_2[0, 1]$ и задача Штурма-Лиувилля с сингулярным весом*//<http://www.arxiv.org/math.FA/0405410>
- [18] И. С. Кац, М. Г. Крейн., *О спектральных функциях струны*. В кн.: Ф. Аткинсон. *Дискретные и непрерывные граничные задачи*. М., 1968, стр. 648–733.
- [19] И. П. Натансон. *Теория функций вещественной переменной*//М.: Наука, 1974.